











**Polyaminated ligands, metal complexes, process for their preparation and diagnostic and therapeutic applications.****Publication number:** EP0661279**Publication date:** 1995-07-05**Inventor:** MEYER DOMINIQUE (FR); ROUSSEAU OLIVIER (FR); SCHAEFFER MICHEL (FR); SIMONOT CHRISTIAN (FR)**Applicant:** GUERBET SA (FR)**Classification:****- international:** C07D257/00; A61K49/00; A61K49/06; C07C229/16; C07D257/02; C07F13/00; C07H15/26; C09K3/00; A61K49/00; A61K49/06; C07C229/00; C07D257/00; C07F13/00; C07H15/00; C09K3/00; (IPC1-7): C07D257/02; A61K49/00; C07C229/16; C07H15/26**- european:** A61K49/06; C07C229/16; C07D257/02; C07H15/26**Application number:** EP19940403038 19941227**Priority number(s):** FR19930015933 19931230**Also published as:** JP7224050 (A)  
 FI946157 (A)  
 EP0661279 (B1)  
 FI113171B (B)  
 CZ289751 (B6)

more &gt;&gt;

**Cited documents:** EP0565930  
 WO8912631  
 EP0529645  
 EP0484989  
 EP0382583[Report a data error here](#)**Abstract of EP0661279**

The subject of the invention is poly(amino acid) derivatives, which are chelators of paramagnetic metal ions, at least 3 of the donor nitrogen atoms of which carry identical or different substituents of formula CH(R1)-X, in which X represents CO<sub>2</sub>Ra, CONRbRc or P(Rd)O<sub>2</sub>H and Ra, Rb and Rc, which are identical or different, represent H or optionally hydroxylated (C1-C8)alkyl; Rd represents OH, (C1-C8)alkyl or (C1-C8)alkoxy; and R1 represents a hydrophilic group with a molecular mass greater than 200 containing at least 3 oxygen atoms, it being understood that at least 3 of the X groups are acidic functional groups, which are optionally salified.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(12) **FASCICULE DE BREVET EUROPEEN**

(45) Date de publication et mention  
de la délivrance du brevet:  
**07.03.2001 Bulletin 2001/10**

(51) Int Cl.7: **C07D 257/02, C07C 229/16,**  
**A61K 49/00, C07H 15/26**

(21) Numéro de dépôt: **94403038.6**

(22) Date de dépôt: **27.12.1994**

(54) **Ligands polyaminés, complexes métalliques, procédé de préparation, applications  
diagnostiques et thérapeutiques**

Polyaminierte Liganden, Metallkomplexe, Verfahren zur Herstellung und diagnostische und  
therapeutische Verwendungen

Polyaminated ligands, metal complexes, process for their preparation and diagnostic and therapeutic  
applications

(84) Etats contractants désignés:  
**AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU NL PT  
SE**

• **Simonot, Christian**  
**F-75020 Paris (FR)**

(30) Priorité: **30.12.1993 FR 9315933**

(74) Mandataire: **Le Guen, Gérard et al**  
**CABINET LAVOIX**  
**2, place d'Estienne d'Orves**  
**75441 Paris Cédex 09 (FR)**

(43) Date de publication de la demande:  
**05.07.1995 Bulletin 1995/27**

(73) Titulaire: **GUERBET**  
**93420 Villepinte (FR)**

(56) Documents cités:  
**EP-A- 0 382 583 EP-A- 0 484 989**  
**EP-A- 0 529 645 EP-A- 0 565 930**  
**WO-A-89/12631**

(72) Inventeurs:  
• **Meyer, Dominique**  
**F-94100 Saint-Maur (FR)**  
• **Rousseaux, Olivier**  
**F-60300 Senlis (FR)**  
• **Schaeffer, Michel**  
**F-77400 Lagny (FR)**

Remarques:

Le dossier contient des informations techniques  
présentées postérieurement au dépôt de la  
demande et ne figurant pas dans le présent  
fascicule.

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du  
brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des  
brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe  
d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

## Description

[0001] L'invention concerne des dérivés de poly(aminoacides) pouvant former des chélates avec les cations métalliques paramagnétiques, ainsi que ces chélates, les procédés de préparation de ces composés et les compositions pour l'imagerie médicale qui contiennent ces chélates.

[0002] En effet, ces complexes métalliques modifient les temps de relaxation des protons, excités par une radiofréquence, dans un champ magnétique, et sont particulièrement utiles comme agents de contraste in vivo pour améliorer les images des organes cibles obtenues par résonance magnétique nucléaire.

[0003] Les complexes de gadolinium, utilisés en clinique humaine, correspondent à une relaxivité spin-réseau, ou longitudinale,  $R_1$  comprise entre 3 et 5  $\text{mM}^{-1}\text{s}^{-1}$  dans l'eau, à 37°C pour 20 MHz.

[0004] Afin d'améliorer la qualité des images, on assiste actuellement à une augmentation des doses, par exemple 0,3 mmole/kg de poids corporel au lieu de 0,1 mmole/kg pour les complexes classiques comportant un seul ion Gd par molécule, augmentation qui peut s'accompagner d'un accroissement des effets secondaires, notamment ceux dus à l'osmolalité des complexes.

[0005] Il serait évidemment préférable d'augmenter l'intensité du signal mesuré en augmentant la relaxivité  $R_1$  de l'agent de contraste.

[0006] On sait que  $R_1$  est augmenté sensiblement lorsque le chélate métallique est greffé sur une macromolécule d'origine biologique ou non, tel que dextran, albumine ou polylysine; néanmoins si la relaxivité  $R_1$  par atome de gadolinium augmente, le rapport de  $R_1$  à la masse moléculaire du complexe conjugué, dit relaxivité massique, diminue de telle sorte que le poids d'une dose diagnostique augmente, ainsi que son coût.

[0007] Les complexes de gadolinium de l'invention donnent des relaxivités  $R_1$  supérieures à celles des complexes connus de masses moléculaires analogues; il est vraisemblable mais on ne saurait être limité par cette explication, que l'introduction d'au moins 3 bras latéraux hydrophiles sur les groupes acides, substituants les atomes d'azote donneurs des ligands connus, diminue sensiblement la liberté de mouvement du complexe paramagnétique et de l'ion paramagnétique qui y est attaché, dont la rotation dans le champ magnétique est ainsi restreinte.

[0008] La présence de bras latéraux a parfois été envisagée dans certaines demandes de brevet, telles que EP-A-299795, EP-A-481420 et WO 89/05802, mais seulement à titre de généralisation de formules, exemplifiées uniquement par des molécules dont les ramifications sont courtes, plus ou moins hydrophobes et situées sur deux des azotes au plus, de telle sorte qu'aucun effet favorable ne pouvait être observé sur la relaxivité massique et n'a, évidemment, été envisagé.

[0009] Par un choix correct des bras latéraux, caractéristiques de l'invention, on peut, et c'est un autre avantage, non seulement améliorer la relaxivité du complexe mais aussi agir sur sa biodistribution, par exemple en introduisant dans ces bras des fragments spécifiques de certains récepteurs biologiques ou encore en utilisant des bras de dimension telle que le volume moléculaire du complexe soit suffisant pour diminuer sa perméabilité vasculaire et qu'il séjourne dans cette zone plus longtemps que les agents de contraste actuels.

[0010] Selon un premier aspect, l'invention concerne des composés de type poly(aminoacides), qui peuvent former des chélates avec les ions métalliques paramagnétiques, caractérisés en ce qu'au moins 3 des atomes d'azote donneurs, à savoir ceux qui formeront des liaisons de coordination avec l'ion métallique, portent des substituants, identiques ou différents, de formule  $\text{CH}(\text{R}_1)\text{-X}$ , dans laquelle X représente  $\text{CO}_2\text{R}_a$ ,  $\text{CONR}_b\text{R}_c$  ou  $\text{P}(\text{R}_d)\text{O}_2\text{H}$  et  $\text{R}_a$ ,  $\text{R}_b$ ,  $\text{R}_c$  représentent indépendamment H ou  $(\text{C}_1\text{-C}_8)\text{alkyle}$ , éventuellement hydroxylé, et  $\text{R}_d$  représente OH,  $(\text{C}_1\text{-C}_8)\text{alkyle}$  ou  $(\text{C}_1\text{-C}_8)\text{alkoxy}$ , et  $\text{R}_1$  représente un groupe hydrophile de masse moléculaire supérieure à 200, comportant au moins 3 atomes d'oxygène,

étant entendu qu'au moins 3 des groupes X sont des fonctions acides, éventuellement salifiées.

[0011]  $\text{R}_1$  peut comporter des atomes d'azote, mais aucun ne saurait être un atome donneur du chélate, c'est-à-dire former une liaison de coordination avec l'ion métallique.

[0012] La plupart des ligands connus pour complexer les cations paramagnétiques tels que  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Mn}^{2+}$ ,  $\text{Gd}^{3+}$ ,  $\text{Dy}^{3+}$ , ou même les éléments radioactifs comme l'yttrium ou le technétium comportent au moins 3 atomes d'azote substitués par un groupe acétique, méthylène phosphonique ou phosphonique, mais les molécules de la présente invention s'en différencient par la présence sur ces 3 substituants d'un bras latéral fonctionnalisé hydrophile. Ces bras, ou ramifications, peuvent être de nature très diverse mais ils doivent présenter suffisamment d'encombrement et comporter des atomes susceptibles de former in vivo avec le milieu environnant des liaisons de telle sorte que ces interactions moléculaires immobilisent la molécule dans le milieu par au moins 3 points.


[0013] Ainsi, le remplacement dans les molécules connues pour complexer des ions métalliques paramagnétiques, des substituants d'au moins 2 des atomes d'azote donneurs par 3, ou mieux 4 groupes  $\text{CH}(\text{R}_1)\text{-X}$  conformes à l'invention, de préférence identiques, permet d'obtenir des composés selon l'invention.

[0014] On peut notamment citer parmi ces molécules connues, celles décrites dans EP-A-232 751, EP-A-255 471, EP-A-287 465, EP-A-365 412, EP-A-391 766, EP-A-438 206, EP-A-484 989, EP-A-499 501, WO-89/01476, WO-

89/10645, et WO-91/11475 ainsi que le ligand du gadopentate et celui du gadotérate.

[0015] Parmi les groupes  $R_1$  convenables, certains ne comportent que des atomes de C, H et O; ce sont notamment des poly[oxy( $C_2-C_3$ )alkylènes], des polyhydroxyalkyles ou les restes d'oligosaccharides ou de polysaccharides, monofonctionnalisés pour permettre leur fixation sur le carbone en alpha de X.

5 [0016]  $R_1$  peut aussi représenter des groupes plus complexes et notamment



10 dans lequel

$R_2$  représente rien, alkylène, alkoxyalkylène, polyalkoxyalkylène, alkylène interrompu par phénylène, phénylène ou un reste hétérocyclique saturé ou non,

G représente une fonction O, CO, OCO, COO, SO<sub>3</sub>, OSO<sub>2</sub>, CONR', NR'CO, NR'COO, OCONR', NR', NR'CS, CSNR', SO<sub>2</sub>NR', NR'SO<sub>2</sub>, NR'CSO, OCSNR', NR'CSNR', P(O)(OH)NR', NR'P(O)-(OH) dans laquelle R' est H, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkyle ou R<sub>3</sub>

15  $R_3$  représente alkyle, phényle, alkyle substitué ou interrompu par un ou des groupes choisis parmi phényle, alkylèneoxy, amino ou amido substitués ou non par alkyle éventuellement substitué ou interrompu par l'un des groupes précédents ou  $R_3$  est le reste d'un composé, éventuellement monofonctionnalisé, choisi parmi les saccharides, les oligosaccharides, les peptides, les macromolécules naturelles ou synthétiques biocompatibles ou les molécules susceptibles de se lier à un biorécepteur endogène,

ainsi que les sels de ces composés avec des acides ou des bases physiologiquement acceptables.

25 [0017] On préfère les composés dans lesquels G est un groupe amido : CONR' ou NR'CO, R' étant H, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkyle ou R<sub>3</sub>, ou est l'atome d'oxygène, formant avec  $R_2$  et  $R_3$  une fonction éther-oxyde ainsi que ceux dans lesquels X est CO<sub>2</sub>H.

[0018] Parmi ceux-ci, les composés dans lesquels les  $R_1$ , identiques ou différents, représentent  $R_2-G-R_3$  sont particulièrement préférés lorsque  $R_2$  représente (C<sub>0</sub>-C<sub>6</sub>)alkylène, éventuellement interrompu par phénylène et  $R_3$  représente (C<sub>1</sub>-C<sub>14</sub>)alkyle éventuellement substitué ou interrompu par un ou des groupes choisis parmi phényle, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)alkoxy, amino et amido substitués ou non par alkyle ou alkoxyalkyle, les saccharides, les oligo-saccharides et les macromolécules biocompatibles telles que polyéthylène glycol et ses éthers en C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> et dextran.

30 [0019] Comme  $R_2$  préféré, on peut citer (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, CH<sub>2</sub>CHOH, CH<sub>2</sub>CHOHCH<sub>2</sub>, (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>CHOH, (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub> ou C<sub>6</sub>H<sub>4</sub> avec n = 1, 2, 3.

[0020] Dans l'ensemble de la présente description, sauf mention contraire, on entend par poly[oxy(C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub>)alkylène], les polyoxyéthylènes et polyoxypropylènes notamment le polyéthylène glycol et ses monoéthers et monoesters en C<sub>1</sub> à C<sub>3</sub>, de masse moléculaire inférieure à 150 000; par saccharides, on entend les hydrates de carbone, tel que mannose, fucose, galactose et les aminosaccharides tel que glucosamine ou galactosamine; par oligosaccharide, on entend les enchaînements linéaires ou cycliques de 2 à 10 unités saccharidiques, tel que le saccharose, le maltotriose et les cyclodextrines; par polysaccharides, on entend notamment les dérivés de la cellulose, ou l'hydroxyéthylamidon, l'inuline ou les dextrans de masse moléculaire inférieure à 20 000 ou même supérieure pour les complexes insolubles dans l'eau; par poly(hydroxyalkyle) on entend les polyols de masse moléculaire inférieure à 20 000 et notamment l'alcool polyvinylique.

[0021] Les groupes alkyles, alkylènes, alkoxy sont sauf mention contraire en C<sub>1</sub> à C<sub>14</sub>, linéaires, ramifiés ou cycliques; ces groupes peuvent être hydroxylés sur un ou plusieurs carbones.

45 [0022] Les groupes phényles, phénylènes et hétérocycliques peuvent être substitués par OH, Cl, Br, I, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkoxy, NO<sub>2</sub>, NR<sub>x</sub>R<sub>y</sub>, NR<sub>x</sub>COR<sub>y</sub>, CONR<sub>x</sub>R<sub>y</sub>, COOR<sub>x</sub>, R<sub>x</sub> et R<sub>y</sub> étant H ou (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkyle.

[0023] Parmi les groupes hétérocycliques, aromatiques, insaturés ou acycliques, on peut citer ceux dérivés du thiophène, furanne, pyranne, pyrrole, pyrrolidine, morpholine, piperazine, imidazole, pyridine, pyrimidine, pyrazine, pyridazine, thiazole, oxazole, pyrrolidine, imidazoline, dioxanne, tétrazole, benzofuranne, indole, quinotéine et isomères ou dérivés plus ou moins saturés.

50 [0024] Parmi les macromolécules naturelles ou synthétiques biocompatibles on peut citer les polyoxy(C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub>)alkylène ou polyéthers, les polysaccharides, les polyaminoacides, comme la polylysine, les protéines comme l'albumine ou les anticorps et leurs fragments, les glycoprotéines ainsi que les oligomères ou polymères en étoile comme les dendrimères et les arborols décrits dans Angew. Chemie, Int. Ed. 29(2) 138-175, 1990 et EP-A-115 771.

55 [0025] On peut aussi, notamment lorsque les chélates sont destinés à être administrés à l'homme par voie orale ou rectale, utiliser des macromolécules insolubles ou peu solubles dans l'eau, telles que les dérivés des acides polyméthacryliques ou la polyvinylpyrrolidone.


[0026] Parmi les molécules susceptibles de se lier à un biorécepteur endogène, et permettant donc de concentrer

le chélate dans un organe ou une partie de celui-ci on peut citer celles mentionnées dans US-4 647 447 et notamment les hormones comme l'insuline, les prostaglandines, les stéroïdes, les anticorps, notamment ceux spécifiques des cellules tumorales, les lipides ou certains sucres comme l'arabinogalactane ou le glucose, des glycoprotéines sans


acide sialique terminal connus pour leur fixation hépatique.

[0027] Par ailleurs, la présence d'une zone hydrophobe sur  $R_1$ , et notamment celle d'un noyau phényle, peut favoriser ainsi la formation de liaisons non-covalentes avec les protéines biologiques et notamment avec l'albumine; cette zone hydrophobe peut aussi se trouver greffée sur une autre partie du poly(aminoacide).


[0028] Par (poly)saccharide monofonctionnalisé, on entend un (poly)saccharide dont l'une des unités saccharidiques à l'extrémité de la chaîne a été modifiée pour permettre la formation de la liaison  $G-R_3$  ou  $CH-R_1$ ; ce type de fonctionnalisation décrit notamment dans J. Polymer. Sc. Part A Polymer chemistry 23 1395-1405 (1985) et 29, 1271-1279 (1991) et dans Bioconjugate chem. 3, 154-159 (1992) est effectué par amination réductrice avec  $NH_3$  ou une amine comportant un groupe réactif ou précurseur d'un groupe réactif ou par oxydation pour donner une lactone. On peut ainsi obtenir un dérivé ayant comme fonction terminale une amine primaire ou un dérivé portant un groupe réactif, comme



avec  $Z_o = H, H_2N(CH_2)_n, O_2NC_6H_4CH_2$  ou un dérivé comportant une fonction acide




à partir du maltose  
tandis que pour le dextran, on obtiendra




[0029] Par polyéthylèneglycol monofonctionnalisé ou par éther de polyéthylène glycol monofonctionnalisé, on entend le composé dont l'une des extrémités porte une fonction réactive, telle que celles décrites dans JMS Res. Macromol. Chem. Phys. C. 25(3) 325-373 (1985); on peut aussi se référer à J. Org. Chem. 45, 5364 (1980) pour la préparation d'un aminopolyéthylène-glycol ou à Makromol. Chem. 182, 1379-1384 (1981) pour différentes méthodes de substitution.

[0030] Un groupe préféré de ligands de l'invention est de formule



dans laquelle


-  $A_1, A_2, A_3$ , indépendamment l'un de l'autre, représentent



m et n étant des nombres entiers, identiques ou différents, compris entre 0 et 5 dont la somme vaut 1 à 5.


R<sub>9</sub>, R<sub>10</sub>, R<sub>11</sub> représentent, indépendamment, H, alkyle, alkoxyalkyle, phényle, alkylène-phényle, R<sub>10</sub> pouvant représenter en outre OH ou alkoxy

ou l'un des R<sub>9</sub> et R<sub>11</sub> parmi A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub> représente la formule




dans laquelle les lettres peuvent avoir les significations des lettres de même indice de la formule I, à l'exclusion de l'un des R'<sub>9</sub> et R'<sub>11</sub> qui représente (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkylène, éventuellement substitué par un ou des (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkoxy, l'autre n'étant pas l';

- p est un nombre entier de 0 à 5;
- R<sub>4</sub>, R<sub>5</sub>, R<sub>6</sub>, R<sub>7</sub> et R<sub>8</sub> représentent, indépendamment, H, alkyle, alkoxyalkyle, amidoalkyle substitué ou non par alkyle ou alkoxyalkyle ou CH(R<sub>12</sub>)X, R<sub>12</sub> étant H, alkyle, alkoxyalkyle ou R<sub>1</sub>, ou les groupes R<sub>4</sub> et R<sub>7</sub> sont liés, et pris ensemble représentent



R''<sub>9</sub>, R''<sub>10</sub>, R''<sub>11</sub>, m' et n'' pouvant avoir les significations des lettres de même indice dans la formule I;

- B est O ou N-W et W représente comme R<sub>5</sub> ou polyoxy(C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub>)alkylène, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)alkylène-Y ou Y, Y étant un hétérocycle saturé ou non de 1 ou 2 cycles accolés, éventuellement substitué par un ou plusieurs OH, alkyle, alkoxy, alkoxyalkyle, ayant jusqu'à 12 sommets, comportant 1 à 4 hétéroatomes choisis parmi O, N, S, étant entendu que lorsque W représente Y, le carbone lié à N est lié à 2 atomes de carbone de l'hétérocycle, ou W représente la formule




dans laquelle les lettres peuvent avoir les significations des lettres de même indice dans la formule I à l'exclusion de R''<sub>9</sub> et R''<sub>11</sub> qui ne peuvent représenter l' et de B'' qui représente N-Q, Q étant (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkylène, éventuellement substitué par un ou des alkoxy,

- ou A<sub>2</sub>-B-A<sub>3</sub> représente un groupe hétérocyclique dans lequel B est un hétérocycle saturé ou non, de 5 ou 6 sommets comportant 1 ou 2 hétéroatomes choisis parmi O, S, N et A<sub>2</sub> et A<sub>3</sub> représentent un groupe CH-R<sub>6</sub> dans lequel R<sub>6</sub> est H ou (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)alkyle, étant entendu qu'au moins 3 groupes parmi R<sub>4</sub>, R<sub>5</sub>, R<sub>6</sub>, R<sub>7</sub>, R<sub>8</sub> et W représentent CH(R<sub>1</sub>)X.


**[0031]** Notamment pour complexer les ions lanthanides, on préfère les composés de formule I qui comportent 3 atomes d'azote différents substitués par au moins un groupe CH(R<sub>1</sub>)X, et mieux par des CH(R<sub>1</sub>)X identiques avec X = CO<sub>2</sub>H.

**[0032]** Un premier ensemble de ligands préférés parmi ceux de formule I est constitué des macrocycles de formule




dans laquelle

- les groupes  $R_1$  sont de préférence identiques, et les X représentent de préférence  $\text{CO}_2\text{H}$ ,
- $A_1$  à  $A_4$  représentent indépendamment



m et n étant des entiers de 0 à 2 dont la somme vaut 1 ou 2 et  $R_9$ ,  $R_{10}$  et  $R_{11}$  représentent indépendamment H, alkyle, alkoxyalkyle, phényle, alkylène-phényle,  $R_{10}$  pouvant représenter aussi OH ou alkoxy ou l'un des  $R_9$  et  $R_{11}$  représente la formule



dans laquelle les lettres peuvent avoir les significations des lettres de même indice de la formule II, à l'exclusion de  $R'_9$  ou  $R'_{11}$  qui est lié au macrocycle II et représente  $(\text{C}_1\text{-C}_8)$ alkylène, éventuellement substitué par alkoxy,






- B représente N-W et W représente comme  $R_5$  ou H, alkyle, alkoxyalkyle, amidoalkylène éventuellement substitué, polyoxy  $(\text{C}_2\text{-C}_3)$ alkylène, ces groupes comportant éventuellement un phényle,  $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ alkylène-Y ou Y, Y étant un hétérocycle saturé ou non, de 1 ou 2 cycles accolés, éventuellement substitué par un ou plusieurs OH, alkyle, alkoxy, alkoxyalkyle, ayant jusqu'à 12 sommets, comportant 1 à 4 hétéroatomes choisis parmi O, N, S étant entendu que lorsque W représente Y, le carbone lié à N est lié à 2 atomes de carbone de l'hétérocycle,

ou W représente la formule II' lorsque  $R_9$  et  $R_{11}$  en diffèrent, dans laquelle les lettres peuvent voir les significations des lettres de même indice de la formule II à l'exclusion de B' qui représente N- $(\text{C}_1\text{-C}_8)$ alkylène, éventuellement substitué par alkoxy, ou encore W représente  $\text{CH}(R_1)\text{X}$ ,



ou  $A_2\text{-B-A}_3$  représente un groupe hétérocyclique dans lequel B est un hétérocycle saturé ou non, de 5 ou 6 sommets comportant 1 ou 2 hétéroatomes choisis parmi O, S, N et  $A_2$  et  $A_3$  représentent un groupe  $\text{CH-R}_6$  dans lequel  $R_6$  est H ou  $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ alkyle.

**[0033]** On préfère les macrocycles dans lesquels  $A_1$  à  $A_4$  représentent  $(\text{CH}_2)_2$  ou  $(\text{CH}_2)_3$  ou l'un d'eux est substitué par  $R_{11}$ ,  $R_{11}$  représentant alkyle, phényle ou alkylène-phényle, de préférence benzyle, éventuellement substitué et mieux ceux dans lesquels B est N-W.

**[0034]** A titre d'exemple de tels macrocycles, on peut citer



$n = 2 \text{ à } 6$




qui sont notamment décrits dans les références précédemment citées.

**[0035]** Dans le cas où un atome de carbone du macrocycle est substitué, on préfère notamment pour ne pas obtenir de mélange d'isomères, que les 4 atomes d'azote soient substitués par le même groupe  $\text{CH}(\text{R}_1)\text{COOH}$ .

**[0036]** Parmi les dérivés du 1, 4, 7, 10-tétraaza-cyclododécane, on préfère ceux de formule






dans laquelle n est 2 ou 3 et

$R_x$  est H,  $(C_1-C_{14})$ alkyle éventuellement hydroxylé, et  $R_y$  est  $(C_2-C_{14})$ alkyle hydroxylé, polyoxy  $(C_2-C_3)$ alkylène, polyhydroxyalkyle ou le reste d'un saccharide, d'un oligosaccharide ou d'un polysaccharide éventuellement monofonctionnalisés;  $R_y$  peut comprendre aussi éventuellement des groupes  $(C_1-C_6)$ alkylène ou phénylène liés aux précédents par des fonctions amides ou éther-oxydes, et Z représente  $NR_xR_y$  ou OH.

[0037] Parmi les dérivés de formule II, on peut citer aussi ceux de formule




dans laquelle n est 2 ou 3

et R représente  $(C_2-C_{14})$ alkyle hydroxylé;

polyoxy  $(C_2-C_3)$ alkylène ou un reste de saccharide, d'oligosaccharide ou de polysaccharide, éventuellement monofonctionnalisés.

[0038] Un autre ensemble de ligands préférés est celui des dérivés linéaires de formule




dans laquelle

-  $A_1$  et  $A_2$  représentent indépendamment



m et n étant 0, 1 ou 2 et leur somme valant 1 ou 2, R<sub>9</sub>, R<sub>10</sub>, R<sub>11</sub> représentant indépendamment H, alkyle, alkoxyalkyle, phényle, alkylènephényle, R<sub>10</sub> pouvant représenter aussi OH ou alkoxy ou l'un des R<sub>9</sub> et R<sub>11</sub> représente la formule



dans laquelle les lettres peuvent avoir les significations des lettres de même indice de la formule III à l'exclusion de R'<sub>9</sub> et R'<sub>11</sub> qui ne peuvent représenter III' et dont l'un représente (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkylène portant éventuellement un ou des alkoxy,

- R<sub>12</sub> représente H, alkyle, alkoxyalkyle ou R<sub>1</sub>, étant entendu qu'au moins 3CH(R<sub>12</sub>)X représentent CH(R<sub>1</sub>)X, et de préférence sont identiques avec X étant CO<sub>2</sub>H.

[0039] Selon un second aspect, l'invention concerne les complexes paramagnétiques formés entre les ligands de l'invention et les ions métalliques paramagnétiques convenables, tels que ceux du gadolinium, du dysprosium du manganèse, ainsi que les compositions d'agents de contraste pour l'imagerie médicale par résonance magnétique nucléaire qui comprennent ces complexes, associés aux véhicules et additifs usuels.

[0040] Les ligands selon l'invention peuvent aussi former des complexes avec des radioéléments comme <sup>99m</sup>Tc ou <sup>90</sup>Y, qui peuvent être utilisés pour établir un diagnostic ou effectuer un traitement thérapeutique.

[0041] Ces complexes se présentent, en général, sous forme de sel interne, résultat de la neutralisation par le cation métallique central de groupes acides du ligand; lorsque le complexe comprend d'autres groupes acides ceux-ci peuvent être salifiés par une base minérale ou organique pharmaceutiquement acceptable y compris les aminoacides, par exemple NaOH, lysine, N-méthylglucamine, arginine, ornithine ou diéthanolamine.

[0042] Les doses auxquelles les agents de contraste selon l'invention peuvent être administrés dépendent de la nature du complexe, de la relaxivité qu'il induit, de la voie d'administration et de l'organe visé. Par exemple par voie orale, notamment pour la sphère gastro-intestinale, on pourra administrer de 0,1 à 2 mM/kg et par voie parentérale de 0,001 à 1 mM/kg.

[0043] Selon un autre aspect, l'invention concerne un procédé de préparation des dérivés de poly(aminoacides) chélateurs qui consiste à faire réagir sur la polyamine qui en constitue le squelette, un réactif nucléophile de formule



dans laquelle Z' représente un halogène ou un sulfonate et les groupes réactifs de R<sub>1</sub> et X sont éventuellement protégés, pour obtenir les atomes d'azote substitués conformément à l'invention, éventuellement après déprotection des groupes réactifs tels que les hydroxyles et les acides.

[0044] Comme dans les substitutions nucléophiles classiques, la réaction peut être effectuée dans un solvant aprotique polaire ou non tel qu'acétonitrile, diméthylformamide, toluène ou dans l'eau ou un alcool pur ou aqueux en présence d'une base minérale, tel qu'un hydroxyde ou carbonate alcalin ou alcalino-terreux, ou d'une amine tertiaire, à une température comprise entre la température ambiante et celle de reflux du solvant.

[0045] Lorsque tous les atomes d'azote de la polyamine ne doivent pas porter des substituants CH(R<sub>1</sub>)X identiques, on peut effectuer des N-alkylations sélectives successives.

[0046] Par exemple, dans le cas du 1,4,7,10-tétraazacyclododécane, on peut effectuer une monoalkylation en faisant réagir un net excès du macrocycle sur Z'(CH(R<sub>1</sub>)X dans des conditions opératoires, convenablement choisies comme décrit dans J. Org. Chem. 58, 3869-3876 (1993) ou en bloquant 3 des N par action de l'orthocarbonate d'éthyle ou d'un acétal de diméthylformamide, comme décrit dans J. Chem. Soc. Chem. Com. 1317-18 (1991); lorsque l'on effectue l'hydrolyse du composé obtenu sans avoir substitué le N non bloqué, on obtient un monoformamide et peut effectuer la trialkylation des 3 autres N.

[0047] On peut aussi obtenir des composés dissymétriques par un choix convenable des réactifs conduisant à la préparation du squelette polyamine; des exemples de ces réactions sont donnés dans EP-299 795, pour la préparation de dérivés linéaires ou cycliques.

[0048] Dans le cas de certains substituants  $R_1$ , notamment ceux de formule  $R_2-G-R_3$ , dans lesquels  $R_3$  est une macromolécule et G est un groupe amido, il est avantageux de préparer les dérivés selon l'invention par l'intermédiaire de composés de formule I dont les atomes d'azote comportent des substituants de formule  $CH(R'_1)X$ ,  $R'_1$  étant de faible masse moléculaire, comportant de 2 à 5 carbones environ.

[0049] Ces intermédiaires de synthèse sont un autre objet de l'invention.


[0050] Ces dérivés sont représentés par les formules I, II, III, pour lesquelles les significations des lettres sont identiques à celles mentionnées précédemment à l'exclusion de celle de  $CH(R_1)X$  qui est  $CH(R_2-G')X'$ ,  $G'$  étant un groupe fonctionnel réactif, précurseur de G dont  $COOR'$ ,  $SO_3R'$ ,  $PO_3R'$ ,  $NHR'$ ,  $SO_2NHR'$ ,  $N=C=S$ ,  $N=C=O$ ,  $OH$  et  $X'$  représente X ou X protégé, notamment sous forme d'ester.

[0051] Par groupe précurseur de G, on entend tous les groupes fonctionnels connus pour permettre la formation d'une liaison covalente dans des conditions opératoires accessibles dans l'industrie et par exemple, outre les groupes précédents, ceux utilisés pour les greffages sur des protéines.


[0052] Ces dérivés peuvent être préparés, comme précédemment décrit pour les dérivés de l'invention de formule I, mais avec les réactifs nucléophiles  $Z'CH(R_2G')X'$ .

[0053] Le couplage de ces intermédiaires aux dérivés réactifs de  $R_3$  pour donner le ligand selon l'invention, dont au moins 3N portent un substituant  $CH(R_2-G-R_3)X$ , peut être réalisé selon des méthodes classiques, notamment celles couramment employées dans les synthèses peptidiques, ou encore après activation des acides sous forme d'halogénures d'acide, d'anhydrides ou en présence d'un agent déshydratant tel que les carbodiimides; selon la nature de  $G'$  et du groupe réactif de  $R'_3$ , on pourra effectuer une alkylation ou une acylation d'amine, ou la condensation d'un aldéhyde sur une amine suivie d'une réduction.

[0054] Parmi ces intermédiaires de synthèse, on peut citer ceux de formule



et les dérivés de formule





et leurs esters d'alkyle ou sels.

[0055] Les composés de formule VI sont particulièrement intéressants, en ce qu'ils permettent d'obtenir des tri- ou

tétraamides dérivés des carboxyles sur le C en  $\gamma$  de l'azote sans modification des  $\text{CO}_2\text{H}$  en  $\alpha$ , lorsque la réaction d'amidification est effectuée par action d'un chélate de VI sur une amine en présence d'un agent déshydratant tel qu'un carbodiimide en milieu aqueux ou organique.

[0056] Selon les conditions opératoires, proportions relatives de réactifs, solvant, durée et température de la réaction, et la réactivité de l'amine mise en oeuvre, on obtient un composé de formule VIII ou IX, ou leurs mélanges.



dans lesquels  $\text{M}^{3+}$  est de préférence  $\text{Gd}^{3+}$ , ce qui permet d'obtenir directement le complexe utile comme agent de contraste, mais  $\text{M}^{3+}$  pourrait être tout cation chélaté par le ligand de formule VI;  $\text{M}^{3+}$  devrait alors, être séparé des ligands VIII ou IX par action d'un acide tel que  $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_2\text{S}$  ou  $\text{HCN}$ , les ligands étant ensuite mis à réagir avec un oxyde ou un sel de l'élément paramagnétique à complexer.

[0057] Il est évident que ce procédé peut être appliqué pour la préparation d'amides à d'autres composés dont le bras latéral comporte une fonction acide et X est  $\text{CO}_2\text{H}$  ou  $\text{PO}_3\text{H}$ .

[0058] En effet, il permet la protection sélective des différents acides et amines impliqués dans la coordination du métal.

[0059] Les complexes métalliques des dérivés de formule I, et ceux des intermédiaires de synthèse de formule VI peuvent être préparés de façon classique par action d'un équivalent de l'oxyde ou d'un sel du métal en milieu aqueux de préférence à une température supérieure à  $20^\circ\text{C}$  mais inférieure à  $90^\circ\text{C}$ .

[0060] Dans ce qui suit, on décrit des exemples de préparation de composés intermédiaires et de ligands ou chélates selon l'invention.

## EXEMPLES

### EXEMPLE 1

[0061] Préparation du composé de formule





Schéma réactionnel :



1. Acide 4-(trifluoroacétamido)benzèneacétique

[0062] Ce composé est préparé selon la méthode décrite par K.D. JANDA et coll. (J. Am. Chem. Soc. 113 n° 1, p. 291 (1991)) avec un rendement de 75%.

[0063] 10 g d'acide 4-aminophénylacétique donnent 12 g de dérivé trifluoroacétylé caractérisé par RMN<sup>1</sup>H.  $\delta$  ppm (DMSO) : 7,45 (d, 4H) ; 7,56 (s, 2H) ; 11,15 (s, 1H).

2. 4-(trifluoroacétamido)benzèneacétate d'éthyle

[0064] Ce composé est obtenu au départ de l'acide précédemment préparé selon la méthode décrite par K.D. JANDA (J.A.C.S. 113 n° 1, p. 291 (1991)) avec un rendement de 33%. 12 g d'acide sont convertis en 4,4 g d'ester qui sont caractérisés en RMN<sup>1</sup>H ( $\delta$  ppm) DMSO : 1,1 (t, 3H) ; 3,6 (s, 2H) ; 4,05 (q, 2H) ; 7,4 (q, 4 H).

3.  $\alpha$ -Bromo 4-(trifluoroacétamido)benzèneacétate d'éthyle

[0065] 4 g (14,5 mmol) d'ester précédemment préparés sont mis en suspension dans  $\text{CCl}_4$  (150  $\text{cm}^3$ ). Le mélange est agité et porté à léger reflux. 2,8 g de N-bromo succinimide et 0,2  $\text{cm}^3$  de solution concentrée d'acide bromhydrique (38%) sont introduits dans le réacteur et le milieu est agité, à reflux, durant 48 h. L'insoluble est filtré et le solvant est évaporé. Le résidu est purifié sur silice (éluant  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ ) pour conduire à 2g de produit purifié.

Rendement : 40%

RMN<sup>1</sup>H ( $\delta$  ppm) : 1,2 (t, 3H) ; 4,1 (q, 2H) ; 5,9 (s, 1H) ; 7,6 - 7,8 (m, 4H) ; 11,4 (s, 1H).

## 4. Préparation du composé 1

[0066] A une solution de 60 mg (0,35 mmol) de 1,4,7,10-tétraazacyclododécane dans 10  $\text{cm}^3$  d'acétonitrile sont ajoutés 120 mg de  $\text{NaHCO}_3$  et 500 mg de dérivé bromé précédemment préparé. La suspension est agitée à une température de 40°C durant 48 h. Le milieu réactionnel est ensuite filtré et le solvant évaporé sous pression réduite.

Le résidu est repris à l'éther isopropylique pour donner 600 mg de produit brut sous forme de poudre. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne de silice (éluant : AcOEt/MeOH 90/10 puis 80/20).

Masse obtenue : 110 mg

Rendement : 32%


RMN <sup>13</sup>C ( $\delta$  ppm)  $\text{CDCl}_3$  : 14,6 ; 61,7 ; 63-67 ; 116 ( $\text{CF}_3$ ) ; 130,6-136 (C aromatiques) ; 155 (CONH) ; 172 CO.

[0067] Les fonctions amines du composé 1 sont ensuite déprotégées par action de  $\text{NaBH}_4$  dans l'éthanol comme décrit dans Chem. Ber. 103, 2437 (1970).


[0068] On obtient ainsi un composé intermédiaire de l'invention, pour lequel  $\text{R}_2 = \text{C}_6\text{H}_4$  et G' est  $\text{NH}_2$ , précurseur d'un composé qui comporte 3 substituants, selon l'invention.

## EXEMPLE 2

[0069] Préparation du composé de formule



2

Schéma réactionnel1. paraméthoxyphénylacétate de t-butyle

[0070] Le produit est préparé selon la méthode décrite par H. GOTTHARDT et coll. (Chem. Ber. 109, p. 740 (1976)) et P.G. NATTINGLY (J. Org. Chem. 46 p. 1557 (1981)). Au départ de 15 g d'acide paraméthoxyphénylacétique, 5 g d'ester t-butylique sont obtenus.

Rendement : 28%

RMN<sup>1</sup>H (δ ppm) : 1,3 (9H, s) ; 3,46 (2H, s) ; 3,75 (3H, s) ; 6,8 - 7,3 (5H, q).

2. α-bromoparaméthoxyphénylacétate de t-butyle

[0071] Le produit est préparé selon la méthode décrite par H. GOTTHARDT et coll. et P.G. MATTINGLY.

[0072] 5 g d'ester t-butylique précédemment préparés conduisent à 2,5 g de dérivé bromé.

Rendement : 33%

RMN<sup>1</sup>H (δ ppm) : 1,48 (9H, s) ; 3,82 (3H, s) ; 5,28 (1H, s) ; 6,83 - 7,6 (5H, m).

3. Préparation du composé 2

[0073] 600 mg de NaHCO<sub>3</sub> sont ajoutés à une solution constituée de 285 mg de 1,4,7,10-tétraazacyclododécane (1,65 mmol) dans 30 cm<sup>3</sup> d'acétonitrile sous agitation. 2 g d'ester α-bromé précédemment préparés sont introduits à la suspension et le milieu réactionnel est agité 48 h à température ambiante. Après filtration et évaporation du solvant, le résidu est purifié par chromatographie sur silice (éluant : CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> / AcOEt/MeOH 80/10/4) pour conduire à 500 mg de produit purifié.

Spectre de masse (FAB<sup>+</sup>) : pic 833

RMN<sup>13</sup>C (δ ppm) 27,6 (CH<sub>3</sub> t-butyle) ; 45-50 (cycle) ; 54,9 (C<sub>3</sub>O) ; 61,1 (t-butyle) ; 68 (NCH) ; 113,6 - 127,2 - 130,4 - 158 (C aromatiques) ; 171 (C = O).


[0074] Les fonctions phénols du composé 2 sont ensuite libérées par action du tribromure de bore comme décrit dans Org. Synth. coll. vol. V, 412 (1973) ou dans J. Org. chem. 44, 4444 (1979).

[0075] On obtient ainsi un composé intermédiaire de l'invention pour lequel R<sub>2</sub> = C<sub>6</sub>H<sub>4</sub> et G' est OH, qui peut être

substitué de façon classique.

**EXEMPLE 3**


[0076] Préparation du composé de formule



3



de l'acide correspondant et du complexe avec  $\text{Gd}^{3+}$



Schéma réactionnel

15

1) SOCl<sub>2</sub>, CCl<sub>4</sub>  
2) N.B.S., HBr 48%  
3) iPrOH



35

1) Hydrazine Hydrate  
MeOH

40

2) HCl dilué

3

## 1. Acide 5-(N-phthalimido)-pentanoïque

45

[0077] 12,6 g (85,1 mmole) d'anhydride phtalique, 10 g (85,1 mmole) d'acide 5-amino-valérique, 1,2 ml (8,51 mmole) de triéthylamine et 130 ml de toluène sont mélangés et agités à reflux 1 h dans un tricol équipé d'un Deanstark pour éliminer l'eau formée par azéotropie. Après une nuit à température ambiante, le précipité formé est filtré, lavé avec de l'heptane, puis 200 ml d'une solution d'acide chlorhydrique 1N, puis 100 ml d'eau. Après séchage, 7,37 g d'acide 5-(N-phthalimido)-pentanoïque sont obtenus sous forme de cristaux blancs avec un rendement de 35% (MP = 115°C).

50

RMN<sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>) δ(ppm) : 7,8 (m, 2H) ; 7,7 (m, 2H) ; 3,7 (t, 2H) ; 2,4 (t, 2H) ; 1,7 (m, 4H) ;  
<sup>13</sup>C (CDCl<sub>3</sub>) : δ(ppm) : 178 ; 168 ; 134 ; 133,9 ; 123,2 ; 37,4 ; 33,3 ; 27,9 ; 21,8.

## 2. Ester isopropylique de l'acide 2-bromo-5-(N-phthalimido)-pentanoïque

55

[0078] 7,2 g (29,1 mmole) d'acide 5-(N-phthalimido)-pentanoïque sont ajoutés à une solution de 3 ml de tétrachlorure de carbone et 8,5 g (116 mmole) de chlorure de thionyle. La solution est portée à reflux 1 heure ; 14 ml de tétrachlorure de carbone, 6,2 g (34,9 mmole) de N-bromo succinimide et 2 gouttes d'acide bromhydrique aqueux à 48% sont ajoutés,

et la solution est laissée à reflux 2 heures. La solution refroidie est versée sur 60 ml d'isopropanol et agitée 30 minutes. Après évaporation sous vide, l'huile obtenue est purifiée sur silice en éluant avec un mélange 50 dichlorométhane / 50 heptane puis dichlorométhane. Après évaporation des solvants, 8,2 g d'ester isopropylique de l'acide 2-bromo-5-(N-phthalimido)-pentanoïque sont obtenus avec un rendement de 76,6% sous forme d'une huile jaune pâle qui cristallise

(M.P. : 75°C).  
 RMN<sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>) : δ(ppm) : 7,85 (m, 2H) ; 7,7 (m, 2H) ; 5 (h, 1H) ; 4,2 (t, 1H) ; 3,7 (t, 2H) ; 1,7 - 2,2 (m, 4H) ; 1,2 (d, 3H) ; 1,25 (d, 3H).

<sup>13</sup>C (CDCl<sub>3</sub>) : δ(ppm) : 168,5 ; 168 ; 133,9 ; 132 ; 123,2 ; 69,7 ; 45,5 ; 36,9 ; 31,9 ; 26,9 ; 21,5 ; 21,3.

### 3. Tétraisopropylester de l'acide -1,4,7,10-tétraazacyclododécane-1,4,7,10-tétra-[2-(5-N-phthalimido) pentanoïque]

[0079] 0,92 g (5,34 mmole) de 1,4,7,10-tétraazacyclododécane, 11,8 g (32,1 mmole) du composé (2) et 3,4 g (32,1 mmole) de carbonate de sodium et 36 ml d'acétonitrile sont agités à reflux 72 h. Après filtration, évaporation sous vide, l'huile obtenue est reprise dans du dichlorométhane et lavée avec de l'eau. Après séchage et évaporation du dichlorométhane, le résidu obtenu est purifié par deux chromatographies flash sur silice, successives avec comme premier éluant un mélange 95 CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>/5 CH<sub>3</sub>OH, puis comme deuxième éluant 95 CH<sub>3</sub>COOC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>5CH<sub>3</sub>OH. Après évaporation des solvants, 4,62 g de tétraisopropylester de l'acide -1,4,7,10-tétraazacyclododécane-1,4,7,10-tétra-[2-(5-N-phthalimido) pentanoïque] sont obtenus avec un rendement de 65% sous forme de cristaux amorphes.

RMN<sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>) : δ(ppm) : 7,5 - 7,85 (m, 16H) ; 4,8 - 5,1 (m, 4H) ; 1 - 3,8 (m, 72 H)

<sup>13</sup>C (CDCl<sub>3</sub>) : δ(ppm) : 167 ; 166,9 ; 162,8 ; 128,4 ; 126,9 ; 117,8 ; 62,2 ; 57,9 ; 45,3 ; 45 ; 32,5 ; 22,3 ; 20,4 ; 16,9 ; 16,7.

### 4. Ester tétraisopropylique de l'acide-1,4,7,10-tétraazacyclododécane-1,4,7,10-tétra-[2-(5-amino) pentanoïque], tétrachlorhydrate

[0080] 1 g (0,76 mmole) de tétraisopropylester de l'acide-1,4,7,10-tétraazacyclododécane-1,4,7,10-tétra-[2-(5-N-phthalimido) pentanoïque], 0,15 ml d'hydrazine hydrate (3,04 mmole) et 8 ml de méthanol sont agités à reflux pendant 1 heure. A température ambiante, 10 ml d'acide chlorhydrique 0,5 M sont ajoutés. Le précipité formé est éliminé par filtration, et le filtrat est évaporé.

### 5. Acide 1,4,7,10-tétraazacyclododécane-1,4,7,10-tétra-[2-(5-amino)pentanoïque](chlorhydrate)

[0081] 3,1 g du dérivé phthalimido obtenu selon 3 et 270 ml de solution aqueuse de HCl 6N sont maintenus au reflux, sous agitation pendant plusieurs jours ; on concentre alors sous pression réduite jusqu'à 20ml, sépare le solide, extrait à l'éther éthylique et amène à sec. Le résidu est purifié par chromatographie sur silice silanisée, en éluant à l'eau ; la solution aqueuse du produit recherché est concentrée et le résidu concrétisé dans l'éthanol, pour donner 1,15 g de l'acide. F = 250°C

RMN<sup>1</sup>H (D<sub>2</sub>O) δppm : 3,8-4 (m,4H) ; 2,8-3,6 (m,24H) ; 1,5-2,2 (m,16H)



### 6. Complexe de l'acide précédent avec Gd<sup>3+</sup>

[0082] 1,2 g du produit précédent et 0,5 g de GdCl<sub>3</sub> . 6H<sub>2</sub>O sont dissous dans 17 ml d'eau. Le pH du milieu évolue avec la réaction ; il est maintenu à 6 par addition d'une solution aqueuse de NaOH 1N ; lorsque le pH est stabilisé à 6, une nouvelle addition de NaOH, l'amène à 7 avant concentration sous pression réduite. Le solide obtenu est concrétisé dans l'éthanol à 75% (V/V).

[0083] On obtient ainsi 1,1 g du produit recherché sous forme de cristaux beiges qui fondent à plus de 300°C.

### EXEMPLE 4

[0084] 1,4,7,10-tétrakis {3-[N(2-hydroxyéthyl)-N-(1-déoxyglucitol)-carboxamido]-1-carboxypropyl}-1,4,7,10-tétraazacyclododécane (complexe de gadolinium, sel de Na composé n° 4).



1. 1,4,7,10-tétrakis-[N,N',N'',N'''-(1,3-diméthoxycarbonyl-propyl)]-1,4,7,10-tétraazacyclododécane

[0085] 43 g (0,18 mol) de diméthyl 2-bromoglutarate préparés selon T.R. HOYE J. Org. Chem. 1982, 47, 4152-4156 sont ajoutés goutte à goutte à un mélange de 4,3 g (0,025 mol) de 1,4,7,10-tétraazacyclododécane, 25 g (0,18 mol) de carbonate de potassium, 100 ml d'acétonitrile, à 50°C. La suspension est agitée 48 heures à cette température, puis filtrée. Après évaporation à sec de l'acétonitrile, le résidu est purifié deux fois par chromatographie flash sur silice avec un gradient de dichlorométhane-méthanol. Après évaporation des solvants, 15 g de poudre beige sont obtenus avec un rendement de 75%.

CCM :  $\text{SiO}_2$   $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  -  $\text{CH}_3\text{OH}$  (9-1)

Rf = 0,8

2. 1,4,7,10-tétrakis-[N,N',N'',N'''-(1,3-dicarboxypropyl)]-1,4,7,10-tétraazacyclododécane

[0086] 15 g (0,019 mol) de composé 1,4,7,10-tétra-kis-[1,3 diméthoxycarbonyl-propyl]-1,4,7,10-tétraazacyclododécane sont agités dans 100 ml de méthanol et 250 ml de solution aqueuse de NaOH N pendant 16 heures à température ambiante. L'octaacide en solution est purifié par fixation sur résine IRA 458 commercialisée par Rohm et Haas puis élution par un gradient d'acide acétique. Après évaporation des solvants, 11 g de poudre blanche sont obtenus avec un rendement de 85%.

CCM :  $\text{SiO}_2$   $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ - $\text{CH}_3\text{OH}$ - $\text{CH}_3\text{COOH}$  (35 - 35 -40)

Rf = 0,2

RMN<sup>13</sup>C DMSO ( $\delta$  ppm) 31,13 ; 47,50 ; 61,13 ; 61,76 ; 172,29 ; 174,9 ;

Spectre de Masse (FAB) pic = 693

3. Complexe avec le gadolinium du composé intermédiaire précédent (pentasel de Na)

[0087] Une suspension de 12,1 g (0,0175 mol) du composé obtenu selon 2 et 6,5 g (0,0175 mol) de  $\text{GdCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  dans 225 ml d'eau est amené à pH 6,5 par addition d'une solution aqueuse de NaOH 1N et maintenue à ce pH par des additions successives. Lorsque le pH n'évolue plus, l'eau est éliminée sous pression réduite pour donner 19,8g de poudre blanche, mélange du produit final avec NaCl.


4. Complexe de gadolinium du 1,4,7,10 tétrakis[3-[N-(2-hydroxyéthyl)-N-(1-déoxyglucitol)-carboxamido]-1-carboxy-propyl]-1,4,7,10-tétraazacyclododécane, monosel de sodium (composé n° 4)

[0088] A une suspension de 2 g (2,9 mmol) du composé obtenu en 2 dans 100 ml d'eau avec 1,1 g (2,9 mmol) de chlorure de gadolinium (III) hexahydrate, à 80°C, est ajoutée une quantité suffisante de solution aqueuse de NaOH 0,1 N pour un pH de 4,3. La solution obtenue est amenée à pH 7 par ajout de la même solution de NaOH puis concentrée


à un volume de 10 ml. Après ajout de 2,8 g (12,2 mmol) de 1-déoxy-1-(2-hydroxyéthylamino) D-glucitol, le pH est amené à 5,3 par addition d'acide chlorhydrique aqueux 1N et 2,3 g (12,2 mmol) de chlorhydrate de 1-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide sont ajoutés, et la solution agitée 16 heures à température ambiante. La solution est amenée à pH 3,5 par addition de résine IRN 77 commercialisée par Rohm et Haas, filtrée, ajustée à pH 5,5 à l'aide de solution aqueuse de NaOH 0,1 N, puis éluée sur silice silanisée. Par évaporation de l'eau puis lavage du résidu deux fois par 100 ml d'éthanol et séchage, 4 g de poudre blanche sont obtenus.

#### EXEMPLE 5

[0089] Complexe de gadolinium du composé n° 5 de formule



avec



#### 1. Préparation de R-NO<sub>2</sub>

[0090] 1g de chlorure de l'acide 5-nitroisophtalique sont introduits à 0°C dans une solution de 2,5 g de bis(trioxa-3,6,9)décylamine, préparée selon la méthode décrite dans Tetrahedron 47 411 (1991), et 1,12 ml de triéthylamine dans 10 ml de dichlorométhane. Le milieu est laissé 2 heures sous agitation à température ambiante puis lavé à l'eau, séché sur Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> et concentré. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur silice en éluant avec un mélange de CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>/CH<sub>3</sub>OH (95/5). On obtient ainsi 2,26 g du produit recherché, sous forme d'huile jaune.

#### 2. 5-amino,N,N,N',N'-tétrakis(trioxa-3,6,9 décyl)1,3-phényldicarboxamide (RNH<sub>2</sub>)

[0091] 2,2 g de dérivé nitré précédent dans 10 ml d'éthanol sont hydrogénés, en présence de Pd/C à 10%, sous une pression de 10<sup>5</sup> Pa à la température de 20°C. Après filtration et concentration sous pression réduite du milieu on obtient 2 g de l'amine sous forme d'huile jaune.  
RMN<sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>) δ(ppm); 6,7 (s,2H); 6,6(s,1H); 3,35-3,7 (m,48H); 3,25 (s,12H).


3. Complexe du composé n° 5 avec  $Gd^{3+}$ 

[0092] 1 g du complexe obtenu à l'étape 3 de l'exemple 4, 3,23 g de  $RNH_2$  et 6,8 g de 1-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide (chlorhydrate) sont dissous dans 13 ml d'eau; la solution est laissée 48 heures, sous agitation, à température ambiante avec une addition de temps en temps d'une solution aqueuse de HCl 1N pour maintenir un pH voisin de 7. Le milieu est amené à 150 ml par addition d'eau puis soumis à une ultrafiltration dans une cassette minisette de type nova, commercialisée par FILTRON (USA), avec une membrane de seuil de coupure 3 KDaltons.

[0093] Le produit recherché a un temps de rétention de 30 minutes, lors d'une gel-filtration dans une colonne Pharmacia de 60 cm x 2 cm remplie de gel Superdex<sup>R</sup> 75, avec un débit d'éluant ( $H_2O$ ) de 1 ml par minute.

EXEMPLE 6

[0094] Complexe avec  $Gd^{3+}$  du composé n° 6 de formule (sel de sodium)




avec  $R = N(CH_2(CHOH)_4-CH_2OH)_2$ .

[0095] On dissout 1 mmol du complexe obtenu à l'étape 3 de l'exemple 4 et 4,6 mmol de bis-(2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl)amine commerciale dans 13 ml d'eau; le pH de la solution est amené à 6 par addition d'une solution aqueuse de HCl 2N, puis on ajoute 21 mmol de chlorhydrate de 1-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide; après 4 heures d'agitation, on ajoute de nouveau 21 mmol du carbodiimide dans le milieu; après une nuit d'agitation on ajoute 100 ml d'eau et filtre la solution sur une résine IRN77, sous forme  $H^+$  commercialisée par Rohm et Haas, puis sur une résine IRA 458, sous forme  $OH^-$ , commercialisée par Rohm et Haas; la solution finale est ultrafiltrée dans une cassette FILTRON, cassette FILTRON, équipée d'une membrane de 1 kDalton de seuil de coupure.


[0096] le produit final a un temps de rétention de 78 minutes dans une gel-filtration sur Superdex<sup>R</sup> 30, avec un débit d'éluant (tampon phosphate pH = 7,2) de 1 ml/min.

EXEMPLE 7

[0097] Complexe avec  $Gd^{3+}$  du composé n° 7 de formule



avec



#### 1. Préparation de $\text{RCH}_2\text{C}_6\text{H}_5$ puis RH d'après J. Carbohydrate Chemistry 11(7) 813-835 (1992)

[0098] On introduit 8,2 ml de benzylamine distillée dans une solution à 60°C de 23,6 g de maltotriose dans 16 ml d'eau. Après 3 heures d'agitation à cette température, on ajoute 60 ml de méthanol et amène le milieu vers 25°C avant d'ajouter par portions 3,56 g de borohydrure de sodium.

[0099] Après 48 heures d'agitation à 20°C, la solution est concentrée et le résidu dissous dans 100 ml de méthanol; on ajoute une solution aqueuse d'acide chlorhydrique 4N jusqu'à pH 3 et on concentre après addition de 2 volumes de méthanol. Le résidu est dissous dans 100 ml de méthanol, filtré, puis la solution est concentrée. Le solide résiduel est lavé à l'éthanol à 70°C puis séché pour donner 25,6 g de  $\text{RCH}_2\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{HCl}$ . L'amine est libérée par action d'une résine IRA 458 commercialisée par Rohm et Haas et purifiée par passage sur une résine IRN77. On obtient ainsi 17,7 g de solide. CCM (silice Merck 60 F)

éluant : dioxane/eau/ $\text{NH}_3$  aqueux 25% (p/V : 8/3/2)

Rf = 0,7

[0100] La benzylamine obtenue est dissoute dans 100 ml d'eau et on ajoute une solution aqueuse de  $\text{NH}_4\text{OH}$  à 25% jusqu'à pH 9. Après addition de 4 g de Pd/C le mélange est hydrogéné sous une pression de  $6 \times 10^5$  Pa pendant 5 heures à 40°C et 12 heures à température ambiante.

[0101] Après filtration, on élimine le solvant sous pression réduite et on purifie l'huile par passage sur une résine IRN77, sous forme  $\text{H}^+$ . On obtient 10,9 g du solide recherché.

CCM (conditions précédentes) Rf = 0,2

RNM<sup>13</sup>C ( $\text{D}_2\text{O}$ ) : 40,6 ( $\text{CH}_2\text{-NH}_2$ ); 57,7-59,5 ( $\text{CH}_2\text{OH}$ ) 66,6-70,1 ( $\text{CHOH}$ ); 74,1 et 79,2 (C-O); 97 et 07,6 ( $\text{O-C-O}$ ).


#### 2. Complexe du composé n° 7 avec $\text{Gd}^{3+}$

[0102] On introduit à 60°C 4,66 g du produit précédemment obtenu dans 210 ml de diméthylformamide, puis 1 g du complexe de  $\text{Gd}^{3+}$  obtenu à l'exemple 4 (3), 886 mg d'hydroxy-1 benzotriazole, 1,25 g de chlorhydrate de 1-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide et 0,9 ml de triéthylamine. Le milieu est maintenu 5 heures sous agitation à 60°C puis 48 heures à température ambiante, avant de concentrer sous pression réduite. Le résidu est trituré dans  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$

puis purifié par ultrafiltration sur une mini-cassette FILTRON avec une membrane de seuil de coupure 1 kDalton.

### EXEMPLE 8

[0103] Complexe avec  $Gd^{3+}$  du composé n° 8 de formule



avec  $R = HN(CH_2CH_2O)_n-CH_3$

[0104] L'éther méthylique de l'aminopolyéthylène glycol ( $MM \approx 5000$ ) peut être préparé selon l'une des méthodes précédemment citées ou acheté dans le commerce.


[0105] 15 g de l'amine sont dissous à 40°C dans 700 ml de diméthylformamide et une solution de 0,5 g du complexe de  $Gd^{3+}$  préparé à l'exemple 4 (3) dans 50 ml d'eau sont ajoutés, puis 0,48 g d'hydrate d'hydroxybenzotriazole, 0,5 ml de triéthylamine et 2,72 g de chlorhydrate de 1-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide.

[0106] Après 5 jours d'agitation à température ambiante, on concentre la solution sous pression réduite. Le résidu, dissous dans 150 ml d'eau, est ultrafiltré dans une minicassette FILTRON avec une membrane de seuil de coupure 5 kDaltons.


[0107] Après lyophilisation, on isole 3,5 g de produit, mélange de triamide (l'un des  $R = OH$ ) et de tétraamide.

### Revendications

1. Dérivés de polyaminoacides, chélateurs d'ions métalliques paramagnétiques, de formule I




ou de formule II




dans lesquelles

- $\text{A}_1, \text{A}_2, \text{A}_3$  et  $\text{A}_4$ , identiques ou différents, représentent




$m$  et  $n$  étant des entiers de 0 à 5 dont la somme vaut 1 à 5 dans la formule I et des entiers de 0 à 2 dont la somme vaut 1 ou 2 dans la formule II,

$\text{R}_9, \text{R}_{10}, \text{R}_{11}$  représentent indépendamment H, alkyle, alkoxyalkyle, phényle, alkylènephényle,  $\text{R}_{10}$  pouvant représenter aussi OH ou alkoxy ou l'un des  $\text{R}_9$  et  $\text{R}_{11}$  de la formule I représente



dans laquelle les lettres peuvent avoir les significations des lettres de même indice de la formule I, à l'exclusion de l'un des  $\text{R}'_9$  et  $\text{R}'_{11}$  qui représente  $(\text{C}_1\text{-C}_8)$ alkylène, éventuellement substitué par un ou des  $(\text{C}_1\text{-C}_8)$ alkoxy, l'autre n'étant pas l'


ou l'un des  $\text{R}_9$  et  $\text{R}_{11}$  de la formule II représente



dans laquelle les lettres peuvent avoir les significations des lettres de même indice de la formule II, à l'exclusion de  $\text{R}'_9$  ou  $\text{R}'_{11}$  qui est lié au macrocycle II et représente  $(\text{C}_1\text{-C}_8)$ alkylène, éventuellement substitué par un ou des alkoxy,

- $\text{R}_4, \text{R}_5, \text{R}_6, \text{R}_7$  et  $\text{R}_8$  représentent, indépendamment, H, alkyle, alkoxyalkyle, amidoalkyle éventuellement substitué par alkyle ou alkoxyalkyle, ou  $\text{CH}(\text{R}_{12})\text{X}$ ,  $\text{R}_{12}$  étant H, alkyle, alkoxyalkyle ou  $\text{R}_1$  ou les groupes  $\text{R}_4$  et  $\text{R}_7$  sont liés et pris ensemble représentent






$\text{R}''_9$ ,  $\text{R}''_{10}$ ,  $\text{R}''_{11}$ ,  $m''$  et  $n''$  pouvant avoir les significations des lettres de même indice dans la formule I.

- B représente  $\text{NCH}(\text{R}_1)\text{X}$  ou N-W et W représente H, alkyle, alkoxyalkyle, amidoalkyle éventuellement substitué par alkyle ou alkoxyalkyle, ces groupes comportant éventuellement en outre un phényle dans le cas de la formule II,  $(\text{C}_1-\text{C}_6)$ alkylène-Y ou Y, Y étant un hétérocycle saturé ou non, de 1 ou 2 cycles accolés, éventuellement substitué par OH, alkyle, alkoxy, alkoxyalkyle, ayant jusqu'à 12 sommets, comportant 1 à 4 hétéroatomes choisis parmi O, N, S, étant entendu que lorsque W représente Y, le carbone lié à N est lié à 2 atomes de carbone de l'hétérocycle,

ou W représente le groupe I'' dans la formule I :



dans laquelle les lettres peuvent avoir les significations des lettres de même indice de la formule I à l'exception d'un des groupes  $\text{R}''_9$  et  $\text{R}''_{11}$  qui ne peut pas représenter I' et de  $\text{B}''_1$  qui représente N-Q, Q étant  $(\text{C}_1-\text{C}_8)$ alkylène éventuellement substitué par un ou plusieurs alcoxy,

ou W représente le groupe II' dans la formule II dans lequel les lettres peuvent avoir les significations des lettres de même indice dans la formule II à l'exception de  $\text{B}''_2$  qui représente N- $(\text{C}_1-\text{C}_8)$ alkylène éventuellement substitué par un ou plusieurs alcoxy,

ou B est O dans la formule I

ou  $\text{A}_2\text{-B-A}_3$  représente un groupe hétérocyclique dans lequel B est un hétérocycle saturé ou non, de 5 à 6 sommets comportant 1 ou 2 hétéroatomes choisis parmi O, S, N et  $\text{A}_2$  et  $\text{A}_3$  représentent un groupe  $\text{CH-R}_6$  dans lequel  $\text{R}_6$  est H ou  $(\text{C}_1-\text{C}_6)$ alkyle,

- p est un nombre entier de 0 à 5 ;
- les X, identiques ou différents, représentent  $\text{CO}_2\text{R}_a$ ,  $\text{CONR}_b\text{R}_c$  ou  $\text{P}(\text{R}_d)\text{O}_2\text{H}$  et  $\text{R}_a$ ,  $\text{R}_b$ ,  $\text{R}_c$ , identiques ou différents représentent H ou  $(\text{C}_1-\text{C}_8)$ alkyle, éventuellement hydroxylé ;  $\text{R}_d$  représente OH,  $(\text{C}_1-\text{C}_8)$ alkyle ou  $(\text{C}_1-\text{C}_8)$ alkoxy,
- et R1 représente un groupe hydrophile de masse moléculaire supérieure à 200, comportant au moins 3 atomes d'oxygène, de formule  $\text{R}_2\text{-G-R}_3$  avec


$\text{R}_2$  représente rien, alkylène, alkoxyalkylène, polyalkoxyalkylène, alkylène interrompu par phénylène, phénylène ou un reste hétérocyclique saturé ou non;

G représente une fonction O, CO, OCO, COO,  $\text{SO}_3$ ,  $\text{OSO}_2$ ,  $\text{CONR}'$ ,  $\text{NR}'\text{CO}$ ,  $\text{NR}'\text{COO}$ ,  $\text{OCONR}'$ ,  $\text{NR}'$ ,  $\text{NR}'\text{CS}$ ,  $\text{CSNR}'$ ,  $\text{SO}_2\text{NR}'$ ,  $\text{NR}'\text{SO}_2$ ,  $\text{NR}'\text{CSO}$ ,  $\text{OCSNR}'$ ,  $\text{NR}'\text{CSNR}'$ ,  $\text{P}(\text{O})(\text{OH})\text{NR}'$ ,  $\text{NR}'\text{P}(\text{O})(\text{OH})$ , dans laquelle R' est H,  $(\text{C}_1-\text{C}_8)$ alkyle ou  $\text{R}_3$ ;

$\text{R}_3$  représente alkyle, phényle, alkyle substitué ou interrompu par un ou des groupes phényles, alkylèneoxy, amino ou amido substitués ou non par alkyle éventuellement substitué ou interrompu par l'un des groupes précédents ou  $\text{R}_3$  est le reste d'un composé, éventuellement monofonctionnalisé, choisi parmi les saccharides et les oligosaccharides, les groupes phényles, phénylènes et hétérocycliques pouvant être substitués par OH, Cl, Br, I,  $(\text{C}_1-\text{C}_8)$ alkyle,  $(\text{C}_1-\text{C}_8)$ alkoxy,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{NR}_x\text{R}_y$ ,  $\text{NR}_x\text{COR}_y$ ,  $\text{CONR}_x\text{R}_y$ ,  $\text{COOR}_x$ ,  $\text{R}_x$  et  $\text{R}_y$  étant H ou  $(\text{C}_1-\text{C}_8)$ alkyle et les groupes alkyle, alkylène, alkoxy, en  $\text{C}_1$  à  $\text{C}_{14}$ , linéaires, ramifiés ou cycliques pouvant être hydroxylés, étant entendu qu'au moins 3 des atomes d'azote donneurs portent un groupe  $\text{CH}(\text{R}_1)\text{X}$ ,

ainsi que les sels de ces dérivés avec des bases minérales ou organiques,

2. Dérivés selon la revendication 1, caractérisés en ce que X représente  $\text{CO}_2\text{H}$ , éventuellement salifié, et  $\text{R}_1$  représente  $\text{R}_2\text{-G-R}_3$  et  $\text{R}_2$  représente  $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ alkylène, éventuellement interrompu par phénylène, G représente  $\text{CONR}'$ ,  $\text{NR}'\text{CO}$  ou O,  $\text{R}'$  étant H,  $(\text{C}_1\text{-C}_8)$ alkyle ou  $\text{R}_3$ , et  $\text{R}_3$  représente  $(\text{C}_1\text{-C}_{14})$ alkyle éventuellement substitué ou interrompu par un ou des groupes phényle,  $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ alkoxy, alkylèneoxy, amino et amido substitués ou non par alkyle éventuellement substitué ou interrompu comme précédemment, ou le reste d'un saccharide ou d'un oligosaccharide éventuellement monofonctionnalisé.
3. Dérivés selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisés en ce que les groupes  $\text{CH}(\text{R}_1)\text{X}$  sont identiques.
4. Dérivés selon la revendication 1 de formule II, dans laquelle  $\text{A}_1, \text{A}_2, \text{A}_3, \text{A}_4$  représentent  $(\text{CH}_2)_n$  avec  $n = 2, 3$  ou l'un d'eux représente  $(\text{CH}_2)_n\text{-CH-R}_{11}$  et les autres  $(\text{CH}_2)_n$  avec  $n' = n - 1$  et  $\text{R}_{11}$  représente alkyle, phényle ou alkylènephényle, éventuellement substitués, les groupes  $\text{CH}(\text{R}_1)\text{X}$  sont identiques et X est  $\text{CO}_2\text{H}$  et B représente N-W.
5. Dérivés selon la revendication 1 de formule




dans laquelle

$\text{R}_x$  est H,  $(\text{C}_1\text{-C}_{14})$ alkyle, éventuellement hydroxylé et  $\text{R}_y$  est  $(\text{C}_1\text{-C}_{14})$ alkyle hydroxylé, ou le reste d'un monosaccharide ou d'un oligosaccharide, éventuellement monofonctionnalisé,  $\text{R}_y$  comportant éventuellement, en outre, des groupes  $(\text{C}_1\text{-C}_4)$ alkylène ou phénylène liés aux précédents par des fonctions amides ou étheroxydes,  
 $n$  est 2 ou 3,  
 et Z représente  $\text{NR}_x \text{R}_y$  ou OH,

ainsi que leurs sels d'acide avec des bases minérales ou organiques.

6. Dérivés selon la revendication 1 de formule




dans laquelle

n est 2 ou 3,


et R représente un reste de saccharide ou d'oligosaccharide, éventuellement monofonctionnalisé, et leurs sels d'acide ou de bases minérales ou organiques.

7. Dérivés selon l'une des revendications 1 ou 2, de formule




dans laquelle

-  $A_1$ , and  $A_2$  représentent indépendamment



m et n étant 0, 1 ou 2 et leur somme valant 1 ou 2,

$R_9$ ,  $R_{10}$ ,  $R_{11}$  représentant indépendamment, H, alkyle, alkoxyalkyle, phényle, alkylènephényle,  $R_{10}$  pouvant représenter en outre OH ou alkoxy ou l'un des  $R_9$  et  $R_{11}$  représente la formule




dans laquelle les lettres peuvent avoir les significations des lettres de même indice de la formule III à l'exclusion de  $R'_9$  et  $R'_{11}$  qui ne peuvent représenter III' et dont l'un représente  $(C_1-C_8)$ alkylène portant éventuellement un ou des alkoxy,

-  $R_{12}$  représente H, alkyle, alkoxyalkyle ou  $R_1$ , les phényles pouvant être substitués par un ou des groupes OH, Cl, Br, I,  $(C_1-C_8)$ alkyle,  $(C_1-C_8)$ alkoxy,  $NO_2$ ,  $NR_xR_y$ ,  $NR_xCOR_y$ ,  $CONR_xR_y$ ,  $COOR_x$  avec  $R_xR_y$  étant H ou  $(C_1-C_8)$ alkyle et les alkyle, alkylène, alkoxy étant linéaires ou ramifiés en  $C_1$  à  $C_{14}$  et éventuellement hydroxylés,


et leurs sels avec des acides ou des bases minérales ou organiques.

8. Dérivé de formule



et ses chelates avec des cations métalliques et leurs sels avec des bases organiques ou minérales.

## 9. Dérivé de formule



VII


dans laquelle T représente H ou (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkyle et ses chelates avec des cations métalliques et leurs sels avec des acides organiques ou minéraux.

10. Chelate formé entre un ion métallique paramagnétique et un dérivé selon l'une des revendications 1 à 9.

11. Chelate selon la revendication 10, dans lequel l'ion est celui du gadolinium ou du manganèse.

12. Composition pour l'imagerie médicale par résonance magnétique nucléaire, caractérisée en ce qu'elle comprend un chelate selon l'une des revendications 10 ou 11 et un véhicule physiologiquement acceptable.

13. Procédé de préparation de chelates d'un dérivé de formule IV selon la revendication 5, qui consiste à faire réagir sur le chelate du dérivé de formule




VI'


où n est 2 ou 3,  
une amine de formule NR<sub>x</sub>R<sub>y</sub> dans laquelle R<sub>x</sub> et R<sub>y</sub> sont tels que définis à la revendication 5.

## Patentansprüche

1. Polyaminosäure-Derivate als Chelatbildner für paramagnetische Metallionen der Formel I




oder der Formel II




in denen

- $\text{A}_1, \text{A}_2, \text{A}_3$  und  $\text{A}_4$ , die gleichartig oder verschieden sind,




bedeuten, worin

$m$  und  $n$  in der Formel I ganze Zahlen mit Werte von 0 bis 5 bedeuten, deren Summe 1 bis 5 beträgt, und in der Formel II ganze Zahlen von 0 bis 2 bedeuten, deren Summe 1 oder 2 beträgt,  $\text{R}_9, \text{R}_{10}$  und  $\text{R}_{11}$  unabhängig voneinander H, Alkyl, Alkoxyalkyl, Phenyl, Alkylphenyl bedeuten, worin  $\text{R}_{10}$  auch OH oder Alkoxy bedeuten kann, oder einer von  $\text{R}_9$  und  $\text{R}_{11}$  der Formel I




bedeutet, worin die Buchstaben die gleichen Bedeutungen besitzen wie die Buchstaben des gleichen Indexes der Formel I mit Ausnahme eines der Reste  $\text{R}'_9$  und  $\text{R}'_{11}$ , der  $(\text{C}_1, \text{C}_8)$ -Alkylen, gegebenenfalls substituiert durch ein oder mehrere  $(\text{C}_1 - \text{C}_8)$ -Alkoxy, bedeutet, während der andere Rest nicht I' bedeutet, oder einer der Reste  $\text{R}_9$  und  $\text{R}_{11}$  der Formel II



bedeutet,

in der die Buchstaben die Bedeutungen der Buchstaben des gleichen Indexes der Formel II besitzen können, mit Ausnahme von  $\text{R}'_9$  oder  $\text{R}'_{11}$ , der an den Makrocyclus II gebunden ist und  $(\text{C}_1 - \text{C}_8)$ -Alkylen, gegebenenfalls substituiert durch ein oder mehrere Alkoxy, darstellt,


- $R_4$ ,  $R_5$ ,  $R_6$ ,  $R_7$  und  $R_8$  unabhängig voneinander H, Alkyl, Alkoxyalkyl, Amidoalkyl gegebenenfalls substituiert durch Alkyl oder Alkoxyalkyl, oder  $\text{CH}(R_{12})X$ , worin  $R_{12}$  H, Alkyl, Alkoxyalkyl oder  $R_1$  darstellt, bedeuten oder die Gruppen  $R_4$  und  $R_7$  verbunden sind und gemeinsam



bedeuten,

worin  $R''_9$ ,  $R''_{10}$ ,  $R''_{11}$ ,  $m''$  und  $n''$  die Bedeutungen der Buchstaben des gleichen Indexes der Formel I besitzen können,

- $B \text{ NCH}(R_1)X$  oder  $N-W$  darstellt, worin  $W$  H, Alkyl, Alkoxyalkyl, Amidoalkyl gegebenenfalls substituiert durch Alkyl oder Alkoxyalkyl, wobei diese Gruppen gegebenenfalls zusätzlich einen Phenylrest im Fall der Formel II tragen,  $(C_1-C_6)$ -Alkylen- $Y$  oder  $Y$  bedeutet, wobei  $Y$  einen gegebenenfalls gesättigten Heterocyclus mit 1 oder 2 verbundenen Ringen darstellt, der gegebenenfalls durch OH, Alkyl, Alkoxy, Alkoxyalkyl substituiert ist, bis zu 12 Ringatome aufweist, 1 bis 4 Heteroatome ausgewählt aus O, N, S besitzt, wobei dann, wenn  $W$   $Y$  darstellt, das an N gebundene Kohlenstoffatom an 2 Kohlenstoffatome des Heterocyclus gebunden ist, oder  $W$  die Gruppe  $I''$  in der Formel I darstellt:



in der die Buchstaben die Bedeutungen der Buchstaben des gleichen Indexes der Formel I besitzen können mit Ausnahme einer der Gruppen  $R''_9$  und  $R''_{11}$ , die nicht  $I'$  darstellen kann, und von  $B''_1$ , welches  $N-Q$  darstellt, worin  $Q$   $(C_1-C_8)$ -Alkylen gegebenenfalls substituiert durch ein oder mehrere Alkoxy bedeutet, oder  $W$  die Gruppe  $I''$  in der Formel II darstellt, worin die Buchstaben die Bedeutungen der Buchstaben des gleichen Indexes der Formel II besitzen können mit Ausnahme von  $B'_2$ , welches  $N-(C_1-C_8)$ -Alkylen gegebenenfalls substituiert durch ein oder mehrere Alkoxy darstellt, oder  $B$  in der Formel I O ist

oder  $A_2-B-A_3$  eine heterocyclische Gruppe darstellt, worin  $B$  ein gegebenenfalls substituierter Heterocyclus mit 5 bis 6 Ringgliedern, die 1 oder 2 Heteroatome ausgewählt aus O, S und N aufweisen, darstellt und  $A_2$  und  $A_3$  eine Gruppe  $\text{CH}-R_6$  bedeuten, worin  $R_6$  H oder  $(C_1-C_6)$ -Alkyl darstellt,

- $p$  eine ganze Zahl von 0 bis 5 bedeutet;
- die Reste  $X$ , die gleichartig oder verschieden sind,  $\text{CO}_2R_a$ ,  $\text{CONR}_bR_c$  oder  $\text{P}(R_d)\text{O}_2\text{H}$  bedeuten und  $R_a$ ,  $R_b$  und  $R_c$ , die gleich oder verschieden sind, H oder gegebenenfalls hydroxyliertes  $(C_1-C_8)$ -Alkyl darstellen;  $R_d$  OH,  $(C_1-C_8)$ -Alkyl oder  $(C_1-C_8)$ -Alkoxy arstellt,
- und  $R_1$  eine hydrophile Gruppe mit einer Molekülmasse von mehr als 200 darstellt, die mindestens 3 Sauerstoffatome aufweist der Formel  $R_2-G-R_3$ , worin  $R_2$  nichts, Alkylen, Alkoxyalkylen, Polyoxyalkylen, Alkylen unterbrochen durch Phenylen, Phenylen oder eine gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rest darstellt;

$G$  eine Funktion der Formeln O, CO, OCO, COO, SO<sub>3</sub>, OSO<sub>2</sub>, CONR', NR'CO, NR'COO, OCONR', NR', NR'CS, CSNR', SO<sub>2</sub>NR', NR'SO<sub>2</sub>, NR'CSO, OCSNR', NR'CSNR', P(O)(OH)NR', NR'P(O)-(OH) darstellt, worin  $R'$  H,  $(C_1-C_8)$ -Alkyl oder  $R_3$  bedeutet;

$R_3$  Alkyl, Phenyl, Alkyl substituiert oder unterbrochen durch eine oder mehrere Phenylgruppen, Alkylenoxy, Amino oder Amido gegebenenfalls substituiert durch Alkyl, welches gegebenenfalls substituiert oder unterbrochen ist durch eine oder oben angegebenen Gruppen, darstellt oder  $R_3$  der Rest einer gegebenenfalls monofunktionalisierten Verbindung ist, ausgewählt aus Sacchariden und Oligosacchariden,

wobei die Phenyl-, Phenylen und heterocyclischen Gruppen durch OH, Cl, Br, I, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, NO<sub>2</sub>, NR<sub>x</sub>R<sub>y</sub>, NR<sub>x</sub>COR<sub>y</sub>, CONR<sub>x</sub>R<sub>y</sub>, COOR<sub>x</sub> substituiert sein können, worin R<sub>x</sub> und R<sub>y</sub> H oder (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl bedeuten und die C<sub>1</sub>-C<sub>14</sub>-Alkylgruppen, C<sub>1</sub>-C<sub>14</sub>-Alkylengruppen und C<sub>1</sub>-C<sub>14</sub>-Alkoxygruppen, die geradkettig, verzweigt oder cyclisch sind, hydroxyliert sein können, mit der Maßgabe, daß mindestens 3 der Donor-Stickstoffatome eine Gruppe CH(R<sub>1</sub>)X tragen,


sowie die Salze dieser Derivate mit anorganischen oder organischen Basen.

2. Derivate nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß X CO<sub>2</sub> H, gegebenenfalls in der Salzform, darstellt und R<sub>1</sub> R<sub>2</sub>-G-R<sub>3</sub> darstellt und R<sub>2</sub> (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkylen, gegebenenfalls unterbrochen durch Phenylen, bedeutet, G CONR', NR'CO oder O bedeutet, worin R' H, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl oder R<sub>3</sub> darstellt, und R<sub>3</sub> (C<sub>1</sub>-C<sub>14</sub>)-Alkyl gegebenenfalls substituiert oder unterbrochen durch eine oder mehrere Phenylgruppen, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkoxy, Alkylenoxy, Amino und Amido gegebenenfalls substituiert durch Alkyl, welches gegebenenfalls substituiert oder unterbrochen ist wie oben angegeben, oder den Rest eines gegebenenfalls monofunktionalisierten Saccharids oder Oligosaccharids darstellt.

3. Derivate nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Gruppen CH(R<sub>1</sub>)X identisch sind.

4. Derivat nach Anspruch 1 der Formel II, worin A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub> und A<sub>4</sub> (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, worin n = 2, oder 3 darstellt, oder eine dieser Gruppen (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-CH-R<sub>11</sub> und die anderen (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, bedeuten, worin n' = n - 1 und R<sub>11</sub> gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Phenyl oder Alkylenphenyl darstellen, wobei die Gruppen CH(R<sub>1</sub>)X identisch sind und X CO<sub>2</sub>H und B N-W bedeuten.

5. Derivate nach Anspruch 1 der Formel



in der


R<sub>x</sub> H, gegebenenfalls hydroxyliertes (C<sub>1</sub>-C<sub>14</sub>)-Alkyl und R<sub>y</sub> hydroxyliertes (C<sub>1</sub>-C<sub>14</sub>)-Alkyl oder den Rest eines gegebenenfalls monofunktionalisierten Monosaccharids oder Oligosaccharids bedeuten, wobei R<sub>y</sub> gegebenenfalls zusätzlich (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkylen- oder Phenylen-Gruppen aufweist, die an die oben angegebenen Gruppen über Amidfunktionen oder Etheroxidgruppen gebunden sind,

n 2 oder 3 darstellt,

und Z NR<sub>x</sub>R<sub>y</sub> oder OH bedeutet,

sowie deren Säuresalze mit anorganischen oder organischen Basen.

6. Derivate nach Anspruch 1 der Formel




V

in der


n 2 oder 3 bedeutet

und R den Rest eines gegebenenfalls monofunktionalisierten Saccharids oder Oligosaccharids darstellt, und deren Säuresalze mit anorganischen oder organischen Basen.


## 7. Derivate nach den Ansprüchen 1 oder 2 der Formel



in der

- A<sub>1</sub> und A<sub>2</sub> unabhängig voneinander

bedeuten,

worin m und n 0, 1 oder 2 darstellen und deren Summe 1 oder 2 beträgt, R<sub>9</sub>, R<sub>10</sub> und R<sub>11</sub> unabhängig voneinander H, Alkyl, Alkoxyalkyl, Phenyl oder Alkylphenyl darstellen, wobei R<sub>10</sub> zusätzlich OH oder Alkoxy bedeuten kann oder eine der Gruppen R<sub>9</sub> und R<sub>11</sub> die Formel

bedeutet,


in der die Buchstaben die Bedeutungen der Buchstaben des gleichen Indexes der Formel III besitzen können mit Ausnahme von R'<sub>9</sub> und R'<sub>11</sub>, die nicht III' bedeuten können und von denen der eine Rest (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkylen, welches gegebenenfalls eine oder mehrere Alkoxygruppen trägt, darstellt,R<sub>12</sub> H, Alkyl, Alkoxyalkyl oder R<sub>1</sub> bedeutet,wobei die Phenylreste durch eine oder mehrere Gruppen OH, Cl, Br, I, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, NO<sub>2</sub>, NR<sub>x</sub>R<sub>y</sub>, NR<sub>x</sub>COR<sub>y</sub>, CONR<sub>x</sub>R<sub>y</sub> oder COOR<sub>x</sub> substituiert sein können, worin R<sub>x</sub> und R<sub>y</sub> H oder (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl bedeuten und die Alkyl-, Alkylen- und Alkoxyreste geradkettige oder verzweigte C<sub>1</sub>-C<sub>14</sub>-Reste sind, die



gegebenenfalls hydroxyliert sind,

und deren Salze mit anorganischen oder organischen Säuren oder Basen.


8. Derivat der Formel



VI

und dessen Chelate mit Metallkationen und dessen Salze mit organischen oder anorganischen Basen.

9. Derivat der Formel



VII


in der T H oder (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl darstellt, und dessen Chelate mit Metallkationen und dessen Salze mit organischen oder anorganischen Säuren.

10. Chelat gebildet zwischen einem paramagnetischen Metallion und einem Derivat nach einem der Ansprüche 1 bis 9.

11. Chelat nach Anspruch 10, worin das Ion das Ion von Gadolinium oder Mangan ist.

12. Zubereitung für die medizinische Bilderzeugung durch kernmagnetische Resonanz, dadurch gekennzeichnet, daß sie ein Chelat nach einem der Ansprüche 10 oder 11 und ein physiologisch verträgliches Trägermaterial umfaßt.

13. Verfahren zur Herstellung von Chelaten des Derivats der Formel IV nach Anspruch 5, welches darin besteht, auf das Chelat des Derivats der Formel




VI'

worin n 2 oder 3 bedeutet,  
 ein Amin der Formel  $\text{NR}_x\text{R}_y$ , in der  $\text{R}_x$  und  $\text{R}_y$  die in Anspruch 5 angegebenen Bedeutungen besitzen, einwirken zu lassen.


# Claims

1. Derivatives of polyamino acids, chelating agents of paramagnetic metallic ions, of formula I



I


or of formula II




II

in which


- $\text{A}_1$ ,  $\text{A}_2$ ,  $\text{A}_3$  and  $\text{A}_4$ , the same or different, represent



m and n being integers from 0 to 5, the sum of which equals 1 to 5 in formula I, and integers from 0 to 2, the sum of which equals 1 or 2 in formula II,  
 $\text{R}_9$ ,  $\text{R}_{10}$  and  $\text{R}_{11}$  represent independently H, alkyl, alkoxyalkyl, phenyl, alkylene phenyl,  $\text{R}_{10}$  being able to represent also OH or alkoxy or one of the  $\text{R}_9$ 's and  $\text{R}_{11}$  of the formula I represents




in which the letters can have the meanings of the letters of the same index of formula I, with the exception of one of the  $R'_9$ 's and  $R'_{11}$  which represents  $(C_1-C_8)$ alkylene, possibly substituted by one or more  $(C_1-C_8)$ alkoxy, the other not being I' or one of the  $R'_9$ 's and  $R'_{11}$  of formula II represents



in which the letters can have the meanings of the letters of the same index of formula II, with the exception of  $R'_9$  or  $R'_{11}$  which is bonded to the macrocycle II and represents  $(C_1-C_8)$ alkylene, possibly substituted by one or more alkoxy,


- $R_4$ ,  $R_5$ ,  $R_6$ ,  $R_7$  and  $R_8$  represent, independently, H, alkyl, alkoxyalkyl, amidoalkyl, which is possibly substituted by alkyl or alkoxyalkyl, or  $CH(R_{12})X$ ,  $R_{12}$  being H, alkyl, alkoxyalkyl or  $R_1$ , or the groups  $R_4$  and  $R_7$  are bonded and taken together represent



$R''_9$ ,  $R''_{10}$ ,  $R''_{11}$ ,  $m''$  and  $n''$  being able to take the meanings of the letters of the same index in formula I.

- B represents  $NCH(R_1)X$  or  $N-W$  and W represents H, alkyl, alkoxyalkyl, amidoalkyl, which is possibly substituted by alkyl or alkoxyalkyl, these groups possibly comprising furthermore a phenyl in the case of formula II,  $(C_1-C_6)$ alkylene-Y or Y, Y being a saturated or non-saturated heterocyclic compound, of 1 or 2 attached cycles, which is possibly substituted by OH, alkyl, alkoxy, alkoxyalkyl, having up to 12 vertices, comprising 1 to 4 heteroatoms chosen from O, N, S, it being understood that when W represents Y, the carbon bonded to N is bonded to 2 carbon atoms of the heterocyclic compound,

or W represents the group I'' in formula I:



in which the letters can have the meanings of the letters of the same index of formula I with the exception

of one of the  $R^*_9$  and  $R^*_{11}$  groups which cannot represent I' and of  $B^*_1$  which represents N-Q, Q being (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkylene, which is possibly substituted by one or several alkoxy, or W represents the group II' in formula II in which the letters can have the meanings of the letters of the same index in formula II with the exception of B'<sub>2</sub> which represents N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkylene, which is possibly substituted by one or several alkoxy,

or B is 0 in formula I


or A<sub>2</sub>-B-AX<sub>3</sub> represents a heterocyclic group in which B is a saturated or non-saturated heterocyclic compound, of 5 to 6 vertices comprising 1 or 2 heteroatoms which are chosen from O, S, N and A<sub>2</sub> and A<sub>3</sub> represent a CH-R<sub>e</sub> group in which R<sub>e</sub> is H or (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)alkyl,

- p is a whole number from 0 to 5;
- the X's, the same or different, represent CO<sub>2</sub>R<sub>a</sub>, CONR<sub>b</sub>R<sub>c</sub> or P(R<sub>d</sub>)O<sub>2</sub>H and R<sub>a</sub>, R<sub>b</sub>, R<sub>c</sub>, the same or different, represent H or (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkyl, possibly hydroxylated; R<sub>d</sub> represents OH, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkyl or (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkoxy,
- and R<sub>1</sub> represents a hydrophilic group of molecular mass greater than 200, comprising at least three atoms of oxygen, of formula R<sub>2</sub>-G-R<sub>3</sub> in which R<sub>2</sub> represents nothing, alkylene, alkoxy, polyalkoxy, alkylene which is interrupted phenylene, phenylene or a saturated or non-saturated heterocyclic residue ;

G represents a function O, CO, OCO, COO, SO<sub>3</sub>, OSO<sub>2</sub>, CONR', NR'CO, NR'COO, OCONR', NR', NR'CS, CSNR', SO<sub>2</sub>NR', NR'SO<sub>2</sub>, NR'CSO, OCSNR', NR'CSNR', P(O)(OH)NR', NR'P(O)(OH), in which R' is H, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkyl or R<sub>3</sub> ;

R<sub>3</sub> represents alkyl, phenyl, alkyl, which is substituted or interrupted by one of the phenyl, alkyleneoxy, amino or amido groups, which are substituted or non-substituted by alkyl, which is possibly substituted or interrupted by one of the preceding groups or R<sub>3</sub> is the remainder of a compound, possibly monofunctionalised, chosen from the saccharides and the oligosaccharides, the phenyl, phenylene and heterocyclic groups being able to be substituted by OH, Cl, Br, I, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkoxy, NO<sub>2</sub>, NR<sub>x</sub>R<sub>y</sub>, NR<sub>x</sub>COR<sub>y</sub>, CONR<sub>x</sub>R<sub>y</sub>, COOR<sub>x</sub>R<sub>y</sub>, and R<sub>y</sub> being H or (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkyl and the alkyl, alkylene, alkoxy groups, which are at C<sub>1</sub> to C<sub>14</sub>, linear, branched or cyclic, being able to be hydroxylated, it being understood that at least 3 of the complexing nitrogen atoms carry a CH(R<sub>1</sub>)X group, as well as the salts of these derivatives with mineral or organic bases.


2. Derivatives according to claim 1, characterised in that X represents CO<sub>2</sub>H, possibly made into a salt, and R<sub>1</sub> represents R<sub>2</sub>-G-R<sub>3</sub> and R<sub>2</sub> represents (C<sub>1</sub>-C<sub>5</sub>)alkylene, possibly interrupted by phenylene, G represents CONR', NR'CO or O, R' being H, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkyl or R<sub>3</sub>, and R<sub>3</sub> represents (C<sub>1</sub>-C<sub>14</sub>)alkyl, possibly substituted or interrupted by one or more of the phenyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)alkoxy, alkyleneoxy, amino and amido groups, which are substituted or non-substituted by alkyl which is possibly substituted or interrupted as previously, or the remainder of a saccharide or of an oligosaccharide, possibly monofunctionalised.
3. Derivatives according to one of the claims 1 or 2, characterised in that the groups CH(R<sub>1</sub>)X are identical.
4. Derivatives according to claim 1 of formula II, in which A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub> and A<sub>4</sub> represent (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub> with n = 2, 3 or one of them represents (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-CH-R<sub>11</sub> and the others (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub> with n' = n - 1 and R<sub>11</sub> represents alkyl, phenyl or alkylene phenyl, which are possibly substituted, the groups CH(R<sub>1</sub>)X are identical and X is CO<sub>2</sub>H and B represents N-W.
5. Derivatives according to claim 1 of formula



15 in which

20  $R_x$  is H, (C<sub>1</sub>-C<sub>14</sub>)alkyl, possibly hydroxylated, and  $R_y$  is hydroxylated (C<sub>1</sub>-C<sub>14</sub>)alkyl, or the remainder of a monosaccharide or of an oligosaccharide, possibly monofunctionalised,  $R_y$  comprising possibly, furthermore, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)alkylene or phenylene groups which are bonded to the former by amide functions or ether oxides,  $n$  is 2 or 3, and  $Z$  represents  $NR_xR_y$  or OH, as well as their acid salts with mineral or organic bases.


25 6. Derivatives according to claim 1 of formula



40 in which

45  $n$  is 2 or 3, and  $R$  represents a remainder of saccharide or of oligosaccharide, possibly monofunctionalised, and their acid salts or mineral or organic bases.

7. Derivatives according to one of the claims 1 or 2 of formula



55 in which

- $A_1$  and  $A_2$  represent independently



15



25

30



45

50



37


acids.

10. Chelate formed between a paramagnetic metallic ion and a derivative according to one of the claims 1 to 9.

11. Chelate according to claim 10, in which the ion is that of gadolinium or of manganese.

12. Compound for medical imagery by nuclear magnetic resonance, characterised in that it comprises a chelate according to one of the claims 10 or 11 and a physiologically suitable vehicle.

13. Method for the preparation of chelates of a derivative of formula IV according to claim 5, which comprises having an amine of formula  $NR_xR_y$ , in which  $R_x$  and  $R_y$  are as defined in claim 5, react upon the chelate of the derivative of formula



where n is 2 or 3.